

第4章 正弦定理と余弦定理

【授業実践例2】 知識・技能の習得段階で行う授業例である。

【学習のテーマ】 正弦定理と余弦定理(教科書 p.152 ~ p.157)

【目標】

- ・ 問題に応じて正弦定理と余弦定理を使い分けて、解を求めることができるようになる。
- ・ 正弦定理と余弦定理を一通り学んだあとに、総まとめ的に習得をはかる。どの定理を適用すればよいかの判断力の養成も1つの狙いである。
- ・ 互いに教え合うことを通じて、正弦定理と余弦定理について、自分の中で今まで以上に深く身についたことを実感させる。
- ・ 授業を振り返って、正弦定理と余弦定理について、自分が理解できていること、理解できていないことをはっきりと認識する。また、振り返りの中から、自分の課題を発見させる。

【授業の流れ】

① 学習内容の説明(一斉学習)	15分	プリントの冒頭に示している「目標」を提示し、指導者が教科書 p.152 ~ p.157 の内容を説明する。
② 練習問題(グループ学習) 答え合わせ	15分 5分	①の説明のもと、4人くらいのグループに分かれて、練習問題に取り組む。お互いに質問したり、説明したりしながら、協力して問題を全部解くことが目標。
③ 確認テスト 答え合わせ	5分 5分	理解度を確認するテストを行う。グループ内で答案を交換して採点し合う。
④ 振り返りカードへの記入	5分	最初に提示した「目標」が達成できたか、自分がまだできないことは何か、を振り返る。
合計	50分	—

【プリント例の説明】

- ① 学習内容の説明(一斉学習)
 - ・ 冒頭に目標「問題に応じて正弦定理と余弦定理を使い分けて、解を求めることができるようになる。」を示している。
 - ・ 教科書 p.152 ~ p.157 の内容を要約して掲載している。StudyaidD.B.の本文データで作成している。ただし、練習は除いている(次のグループ学習のプリントで使用する)。
 - ・ 教科書 p.152 ~ p.157 の内容を学習している前提で、説明時間の目安を15分に設定している。
- ② 練習問題(グループ学習)
 - ・ 問題1~4の4問を用意している。教科書 p.154 練習19, 練習20, p.156 練習21, p.157 練習22で構成している。
 - ・ 様々な要素を含む範囲であるため、質問や教え合いが出てくる場合も多いだろう。
 - ・ 問題が多いと感じられる場合は、問題を削ってより定着をはかるようにしてもよい。逆に問題が少ないと感じられる場合は、問題の類問を、問題集から探して追加してもよい。
- ③ 確認テスト
 - ・ ②練習問題の同問(練習19(2), 練習21(1), 練習22)で構成している。ほぼ全員が満点を取り、自信がつけられるようにしたい。
 - ・ 生徒の状況に応じて、問題数を増やしたり、問題集から類問をとってきたりしてもよい。

① 学習内容の説明

()組()番 名前()

【学習のテーマ】正弦定理と余弦定理（教科書 152 ～ 157 ページ）

【目標】問題に応じて正弦定理と余弦定理を使い分けて、解を求めることができるようになる。

*まず、今回の学習内容の説明をします。ノートは取らなくてもよいです。説明を聞くことに集中してください。

[数学 I 本文ページ152]

■正弦定理

三角形について、次の 正弦定理 が成り立つ。

正弦定理
 $\triangle ABC$ の外接円の半径を R とすると

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

[712数学 I 本文ページ154]

三角形の1辺の長さや2つの角の大きさが与えられた場合は、正弦定理を用いて、残りの2辺の長さを求めることができる。

例題8 $\triangle ABC$ において、 $a=10$ 、 $B=60^\circ$ 、 $C=75^\circ$ のとき、 b を求めよ。


解 $A+B+C=180^\circ$ であるから
 $A=180^\circ-(60^\circ+75^\circ)=45^\circ$
 正弦定理により

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$$

であるから

$$\frac{10}{\sin 45^\circ} = \frac{b}{\sin 60^\circ}$$

ゆえに $b = \frac{10}{\sin 45^\circ} \cdot \sin 60^\circ = 5\sqrt{6}$



例題9 $\triangle ABC$ において、 $a=6$ 、 $A=30^\circ$ のとき、外接円の半径 R を求めよ。

解 正弦定理により、 $\frac{a}{\sin A} = 2R$ であるから

$$\frac{6}{\sin 30^\circ} = 2R \quad \text{よって} \quad R = \frac{6}{2\sin 30^\circ} = 6$$

[数学 I 本文ページ155]

■余弦定理

三角形について、次の 余弦定理 が成り立つ。

余弦定理
 $\triangle ABC$ において

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

[712数学 I 本文ページ156]

三角形の2辺の長さや1つの角の大きさが与えられた場合は、余弦定理を用いて、残りの辺の長さを求めることができる。

例題10 $\triangle ABC$ において、 $b=2$ 、 $c=3$ 、 $A=60^\circ$ のとき、 a を求めよ。


解 余弦定理により

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$= 2^2 + 3^2 - 2 \cdot 2 \cdot 3 \cos 60^\circ$$

$$= 7$$

$a > 0$ であるから $a = \sqrt{7}$



[数学 I 本文ページ157]

例題11 $\triangle ABC$ において、 $b=7$ 、 $c=8$ 、 $B=60^\circ$ のとき、 a を求めよ。


解 余弦定理により

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$$

であるから

$$7^2 = 8^2 + a^2 - 2 \cdot 8 \cdot a \cos 60^\circ$$

ゆえに $a^2 - 8a + 15 = 0$
 これを解いて $a = 3, 5$



② 練習問題－1 (20分)

()組()番 名前()

*グループで練習問題に取り組んでください。①～④の4問, 制限時間は20分です。チームで協力して満点を取るのが目標です。

*まず自分で考えてみます。そして, 自分では分からなかったら, グループの人に質問してみましょう。質問された人は説明してください。チームで協力しましょう。

① [数学 I 練習19]

$\triangle ABC$ において, 次のものを求めよ。

(1) $b=6, B=30^\circ, C=45^\circ$ のとき c

(2) $c=4, A=120^\circ, B=15^\circ$ のとき a

② [数学 I 練習20]

$\triangle ABC$ において, 外接円の半径を R とする。次のものを求めよ。

(1) $b=8, B=60^\circ$ のとき R

(2) $a=R$ のとき A

③ [数学 I 練習21]

△ABCにおいて、次のものを求めよ。

(1) $a=3$, $c=2\sqrt{2}$, $B=45^\circ$ のとき b

(2) $a=8$, $b=7$, $C=120^\circ$ のとき c

④ [数学 I 練習22]

△ABCにおいて、 $a=\sqrt{5}$, $b=\sqrt{2}$, $A=45^\circ$ のとき、 c を求めよ。

()組()番 名前()

③ 確認テスト (5分) →答え合わせ→振り返りカード

*1人で解いてみましょう。制限時間は5分です。

*5分後に、グループ内で答案を交換して、答え合わせをしてください。

間違えていたら直してあげてください。

*最後に「振り返りカード」に記入してください。

1

次のような $\triangle ABC$ において、次のものを求めよ。

(1) $c=4$, $A=120^\circ$, $B=15^\circ$ のとき a

(2) $a=3$, $c=2\sqrt{2}$, $B=45^\circ$ のとき b

(3) $a=\sqrt{5}$, $b=\sqrt{2}$, $A=45^\circ$ のとき c